



# leverpunctie

In overleg met uw arts heeft u besloten om een leverpunctie te laten verrichten. Bij dit onderzoek neemt de arts met een dunne holle naald een klein stukje weefsel uit de lever. Door de leverpunctie kunnen we het weefsel onder de microscoop onderzoeken om leverafwijkingen op te sporen. In deze folder geven wij u informatie over deze ingreep.

## Belangrijk!

- Let goed op de voorbereidingen! De ingreep kan alleen doorgaan als u deze voorbereidingen volgt.
- Meld bij het maken van een afspraak of u diabetespatiënt bent.
- Bloedverdunnende, ontstekingsremmende en pijnstillende medicijnen kunnen de kans op bloedingen vergroten. Ze moeten bij voorkeur enkele dagen voor de ingreep niet worden ingenomen. Overleg dit vooraf met uw verwijzend arts. Stop **nooit** op eigen initiatief met deze medicijnen!
- Bent u diabetespatiënt en gebruikt u 's ochtends medicijnen, vraag dan aan uw verwijzend arts hoe u het medicijngebruik kunt aanpassen.
- Bent u zwanger of denkt u dit te zijn, meld dit dan aan de arts. Er is meestal geen bezwaar tegen het ondergaan van het onderzoek.
- Voor de leverpunctie kan plaatsvinden, moet uw bloed onderzocht worden in verband met stolling. Dit onderzoek mag maximaal drie maanden oud zijn en moet minimaal één dag voor de leverpunctie gebeuren. De arts maakt hiervoor een afspraak met u.

## Uw afspraak

In verband met het afsprakenprogramma verzoeken wij u vriendelijk om tenminste vijftien minuten voor tijd aanwezig te zijn. Bent u verhinderd, neem dan tenminste 24 uur van tevoren telefonisch contact op met de Endoscopie- en Behandelafdeling, via telefoonnummer (020) 599 29 09.

Neem bij ieder bezoek mee:

- de aanvraagbrief, verwijsbrief of CD-rom van uw verwijzend specialist
- een legitimatiebewijs, zoals bijvoorbeeld uw identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort
- uw medicijnkaart.

## Patiëntenpas

Indien u geen patiëntenpas van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis heeft, laat u vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie bij de hoofdingang een pas maken. Dit duurt ongeveer tien minuten. Op de patiëntenpas komt uw foto te staan. Deze foto wordt ter plekke bij de Inschrijfbalie gemaakt.

Heeft u een patiëntenpas maar zijn uw gegevens gewijzigd, geef dit dan door bij de balie van de Endoscopie- en Behandelafdeling.

## Waar meldt u zich

- Locatie Oosterpark: Loop vanaf de hoofdingang voorbij het eerste polikliniekplein P1. Neem links de lift of rechts de trap naar de eerste verdieping. Volg dan de borden 'Endoscopie- en Behandelafdeling'. Daar meldt u zich bij de balie.

- Locatie Prinsengracht: U volgt vanaf de hoofdingang de borden Endoscopie- en Behandelafdeling. Daar meldt u zich bij de balie.

## De ingreep

### *Vorbereiding thuis*

U mag 's morgens een licht ontbijt gebruiken, bijvoorbeeld een kopje thee en een beschuit. U mag vanaf twee uur voor de behandeling niets meer eten of drinken.

### *De ingreep*

- Meestal doen we een leverpunctie onder echogeleiding. Dit betekent dat echoscopisch onderzoek wordt gedaan om de plaats van de punctie te bepalen.
- Als de punctie wordt gedaan zonder echogeleiding, dan heet dit een blinde leverpunctie.
- Voorafgaand aan de ingreep meet een endoscopie-assistent uw bloeddruk, temperatuur en hartslag.
- U krijgt van de arts duidelijke instructies over hoe u moet liggen en ademen tijdens de punctie. Voor de punctie krijgt u een plaatselijke verdoving in uw rechterzij. Daarna neemt de arts op dezelfde plek met een holle naald een klein stukje weefsel weg.

### *Duur van de ingreep*

De voorbereiding en de ingreep duren twintig tot dertig minuten.

### *Na de ingreep*

- **Bedrust:** na een leverpunctie onder echogeleide moet u twee uur in bed blijven. Na een blinde leverpunctie moet u ongeveer vier uur bedrust houden. Van deze vier uur dient u de eerste drie uur op de rechterzijde te blijven liggen. Het laatste uur mag u op uw rug liggen. Deze tijden kunnen veranderen als de arts dit nodig vindt. U verblijft in een bed op de Endoscopie- en Behandelafdeling.
- De punctie kan schouderpijn veroorzaken. U kunt hiervoor een pijnstillers vragen aan de verpleegkundige op de uitslaapkamer.
- De endoscopie-assistent controleert regelmatig uw bloeddruk, hartslag en de plek waar de punctie heeft plaatsgevonden.
- U mag weer eten en drinken twee uur na een leverpunctie onder echogeleide en vier uur na een blinde leverpunctie.

### *Complicaties*

- Een mogelijke complicatie is een nabloeding.
- Wanneer u na thuiskomst ernstige klachten krijgt, kunt u tussen 8.00 en 16.30 uur contact opnemen met de Endoscopie- en Behandelafdeling, via telefoonnummer (020) 599 29 09. Buiten deze uren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp, via telefoonnummer (020) 599 30 16.

### *De uitslag*

De uitslag van het weefselonderzoek is niet meteen beschikbaar. Uw verwijzend arts (degene die de ingreep heeft aangevraagd) bespreekt met u de resultaten van de ingreep.

### **Klacht of opmerking**

Wij doen er alles aan uw bezoek aan ons ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan uw opmerkingen of klachten direct te bespreken met de betrokkene(n) of de leidinggevende van onze afdeling. Andere mogelijkheden vindt u in de folder 'Klacht of opmerking?'. Deze folder is verkrijgbaar op de afdeling, bij het Voorlichtingscentrum of via [www.olvg.nl](http://www.olvg.nl).

### **Vragen**

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de Endoscopie- en Behandelafdeling. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur, via telefoon (020) 599 29 09. U kunt ook de website [www.olvg.nl](http://www.olvg.nl) raadplegen.



onze lieve vrouwe gasthuis  
amsterdam

- locatie oosterpark  
oosterpark 9
- locatie prinsengracht  
prinsengracht 769

postadres  
postbus 95500  
1090 hm amsterdam

telefoonnummer  
(020) 599 91 11

website  
[www.olvg.nl](http://www.olvg.nl)

algemene voorwaarden  
op behandelingen in het olvg  
zijn de algemene voorwaarden  
van het olvg van toepassing  
zie [www.olvg.nl](http://www.olvg.nl)

Redactie en uitgave  
Communicatie en Patiëntenvoorlichting  
juli 2009/maag-darm-leverziekten/007576-1/301-122