

Coloninloop

röntgenfoto van de dikke darm

Een coloninloop is een röntgenfoto van de dikke darm. Op röntgenfoto's is de binnenkant van het lichaam zichtbaar. De foto's worden gemaakt met behulp van röntgenstralen die gemakkelijk door weefsels heendringen. Het verschil in doorlaatbaarheid van weefsels maakt de verschillende structuren in het lichaam zichtbaar, zoals de dikke darm.

Röntgenonderzoek is nagenoeg onschadelijk, omdat het meestal gaat om enkele onderzoeken per jaar. Medewerkers van röntgenafdelingen nemen plaats achter een speciaal schot, omdat zij door hun werk anders aan te veel straling zouden blootstaan.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger, neem dan voor nader overleg contact op met de afdeling Radiologie. Een radiologisch onderzoek kan in de eerste maanden van de zwangerschap namelijk schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het ongeboren kind.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een halfuur tot 45 minuten.

Voor het onderzoek

Reinigen van de darm

De darm wordt gereinigd door van tevoren een grote hoeveelheid vloeistof in te nemen. Hiervoor krijgt u instructies mee. Het is van groot belang de volledige hoeveelheid laxeermiddel in te nemen. Het voorbereidingsschema voor het laxeren ziet er als volgt uit (voorgeschreven laxeermiddel MOVIPREP):

De dag voor het onderzoek:

- U mag als laatste om 13.30 uur een lichte lunch gebruiken.
- Vanaf het moment dat u start met Moviprep mag u geen vast voedsel meer gebruiken.
- U mag dus niets meer eten tot na het onderzoek!

Hoe en wanneer te gebruiken:

- Open de doos met Moviprep, daarin vindt u 2 doorzichtige zakjes.
- Open 1 doorzichtig zakje en doe de inhoud van beide witte zakjes in een beker.

- Voeg 1 liter water toe en roer totdat de vloeistof helder of licht troebel is, dit kan 5 minuten duren.
- Drink vanaf 14.00 uur om de 10 – 15 minuten 1 glas, zodat na 1 tot 2 uur de hele beker leeg is.
- Tijdens het gebruik van de Moviprep drank drinkt u nog minstens 1 liter extra van een heldere vloeistof, dit kan zijn: water, heldere soep, vruchtensap zonder vruchtvlees, frisdrank zonder koolzuur, thee of koffie zonder melk.
- Om 18.30 uur bereidt u de inhoud van het andere doorzichtige zakje op dezelfde wijze.
- Ook van deze drank om de 10 tot 15 minuten 1 glas drinken.
- Wederom drinkt u tijdens het gebruik van de Moviprep drank minstens 1 liter extra van een heldere vloeistof, dit kan zijn: water, heldere soep, vruchtensap zonder vruchtvlees, frisdrank zonder koolzuur, thee of koffie zonder melk.

Tips voor de Moviprep drank

Indien u de smaak van de Moviprep wilt afwisselen kunt u onderstaande tips opvolgen:

- Drink de Moviprep ijskoud uit de koelkast.
- Drink de Moviprep met een rietje zodat de vloeistof wat verder in de mond komt.

Wat u kunt verwachten tijdens het gebruik van Moviprep:

- Als u Moviprep begint te drinken moet u in de nabijheid van een toilet blijven.
- Op een bepaald moment zult u een waterige ontlasting beginnen te krijgen.
- Dit is normaal en betekent dat de Moviprep oplossing werkt.
- De ontlasting zal snel stoppen nadat u gestopt bent met drinken van de Moviprep.

De dag van het onderzoek:

- U mag tot één uur vóór het onderzoek alleen water drinken zonder koolzuur.
- U mag voor het onderzoek niets eten.
- Eventuele medicijnen mag u gewoon blijven innemen.

Het onderzoek

De laborant wijst u de weg naar de kleedkamer. Nadat u zich heeft uitgekled, krijgt u een schort aan en slofjes aan uw voeten. Tijdens het onderzoek ligt u op de röntgentafel. Door een slangetje van drie centimeter in uw anus laat de radioloog het contrastmiddel bariumpap en lucht via de anus in de darm lopen.

De radioloog volgt het onderzoek op een tv-monitor en legt de beelden vast op de röntgenfilm. Om alle delen van de darmen goed te fotograferen, moet u op aanwijzing van de radioloog draaien.

Na het onderzoek

Op de afdeling

- Na het onderzoek mag u weer gewoon eten en drinken.
- U kunt naar het toilet om de bariumpap en de lucht weer kwijt te raken.
- Het is verstandig om na het onderzoek de hele dag veel water te drinken om verstopping te voorkomen.

De uitslag

Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken.

Naar huis

Na het onderzoek mag u naar huis. Gebruik van eigen of openbaar vervoer is geen probleem.

Bijverschijnselen

U kunt last krijgen van darmkrampen en diarree. Meestal is dit van korte duur. De dagen na het onderzoek kan uw ontlasting wit gekleurd zijn door de bariumpap.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl
Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact

afdeling Radiologie, locatie West

T 020 510 88 98 (ma t/m vrij 8.00 - 16.30, di en do ook van 17.30 – 21.uur (niet tijdens schoolvakanties)

Route 15

Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?

Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Uw afspraak is op _____ - _____ - _____ om _____ : _____ uur

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden

Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, mei 2017/2165