

Flaporen of afstaande oren

Flaporen of afstaande oren, ook wel zeiloren genoemd, komen veel voor. De vorm van het kraakbeenskelet van de oorschelp is aangeboren.

Flaporen kunnen met behulp van plastische chirurgie worden gecorrigeerd. De operatie kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer vijf tot zes jaar. Dit is meestal ook de leeftijd, waarop kinderen op negatieve wijze met het afwijkende oor geconfronteerd wordt. Het komt steeds vaker voor, dat men zich op latere leeftijd pas laat opereren.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl
Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact

polikliniek Plastische Chirurgie, locatie West

T 020 510 86 70 (ma t/m vrij 8.30 – 16.00 uur)

Route 05

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

IJburg
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 9 juni 2017, 2282

