

Gewricht

röntgenonderzoek - infiltratie

U heeft in overleg met uw arts besloten een röntgenonderzoek met contrastmiddel uit te laten voeren. Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk delen van het lichaam zichtbaar te maken op röntgenfoto's, die met foto's zonder contrastmiddel niet te zien zijn. In deze folder geven wij u informatie over de gang van zaken voor, tijdens en na het onderzoek.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of denkt te zijn, neem dan vóór het onderzoek contact op met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Tijdens de zwangerschap maken we liever geen röntgenfoto's, tenzij het echt noodzakelijk is.

Weet u dat u overgevoelig bent voor bepaalde genees- of contrastmiddelen, dan verzoeken wij u dringend dit vóór het onderzoek te melden aan de behandelend arts of de radiologisch laborant.

Het onderzoek: röntgenonderzoek gewricht (infiltratie)

Dit onderzoek wordt ook wel marcaïnatie genoemd. Met behulp van dit onderzoek proberen we vast te stellen wat de oorzaak is van uw pijnklachten. Als dit al is vastgesteld, doen we het onderzoek om aanvullende medicijnen toe te dienen.

Met behulp van röntgenonderzoek plaatst de radioloog een injectienaald in het gewricht, dat mogelijk de oorzaak is van uw pijnklachten. Om de positie van de naald te controleren spuit hij een geringe hoeveelheid contrastmiddel in. Als de naald goed zit, brengt hij direct via hetzelfde naaldje de verdovingsvloeistof in. Als de pijnklachten afkomstig zijn uit dit gewricht zullen de pijnklachten afnemen. Neemt de pijn niet af, dan betekent dit dat de oorsprong van de pijn waarschijnlijk ergens anders gelegen moet zijn. Dit moet dan door uw orthopeed nader bepaald worden.

Wanneer bij een eerdere punctie al is vastgesteld dat de klachten uit een bepaald gewricht komen kan een aanvullende punctie worden verricht. Hierbij brengt de arts zowel een pijnstillertje als een ontstekingsremmer in. Uw verwijzend arts bepaalt dit voorafgaand aan het onderzoek.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek adviseren wij u minimaal vier uur geen auto te rijden of te fietsen. De contrastvloeistof die in het gewricht is ingebracht verdwijnt via de bloedstroom en de urinewegen vanzelf uit uw lichaam.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

De uitslag

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt binnen vijf dagen de uitslag van het onderzoek.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl. Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online

- www.olvg.nl/radiologie

Contact

afdeling Radiologie, locatie Oost

T 020 599 33 25 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

E radiologieoosterpark@olvg.nl

Route C1

afdeling Radiologie, locatie West

T 020 510 88 98 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

Route 15

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene-voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 3 mei 2018, 3273