

Lumbale sympathicusblokkade - LSB

Een blokkade van de lumbale sympathicus kan worden toegepast bij doorbloedingsstoornissen aan het been, CRPS, lage rugpijn en bepaalde zenuwpijnen, zoals fantoompijn.

Voor de lendenwervels ligt aan weerszijde een zenuwbaan; de sympathische grensstreng of lumbale sympathicus. Deze maakt deel uit van het autonome (onwillekeurige) zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel regelt automatisch bijna alle onbewuste functies en processen in het lichaam, zoals spijsvertering, hartslag en de hoeveelheid bloed die door de bloedvaten gaat. De lumbale sympathicus is ook belangrijk voor pijn.

Door blokkades van de lumbale sympathicus wordt de pijngeleiding beïnvloed, zodat het pijnsignaal voor langere tijd verminderd kan worden doorgegeven. Het kan de doorbloeding van de benen verbeteren.

Vorbereiding

Bloedverdunners

De pijnspecialist vertelt u als u moet stoppen met uw bloedverdunners.

Zorg dat u weet hoeveel dagen u voor uw behandeling met de bloedverdunners moet stoppen en wanneer u weer mag beginnen hiermee.

Overige medicatie

Deze kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.

Eten en drinken

U mag voor de behandeling alles eten en drinken.

Krijgt u een roesje met propofol? Dan gelden andere afspraken. De arts geeft u hierover informatie.

Kleding en sieraden

Draag makkelijk zittende kleding. Wij verzoeken u geen sieraden te dragen in het te behandelen gebied.

Begeleiding naar huis

U mag de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg dat er iemand is om u op te halen na de behandeling.

Ook belangrijk

- Meld voor de behandeling altijd aan de pijnspecialist of verpleegkundige of:
 - u (mogelijk) zwanger bent
 - u allergisch bent voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen
 - u een pacemaker of ICD heeft
- Neem voor de behandeling contact op met het Pijncentrum als:
 - u geen pijn of klachten meer heeft
 - u de dag van de behandeling ziek bent of koorts heeft

De behandeling

Therapeutische behandeling

Met behulp van röntgenstralen en plaatselijke verdoving brengt de arts een naald in de lage rug, in de buurt van de zenuwbaan van de lumbale sympathicus. Hij controleert met contrastvloeistof of de naald op de juist plaats staat. Vervolgens wordt er verdovingsvloeistof ingespoten. De verdovingsvloeistof zorgt dat het pijnsignaal verminderd kan worden doorgegeven.

- Als de pijn tijdelijk duidelijk minder is geworden met de blokkade met verdovingsvloeistof, dan kan een definitieve blokkade van de lumbale sympathicus worden gedaan.
- Behandeling met fenol
Met behulp van röntgenstralen en plaatselijke verdoving brengt de arts een naald in de lage rug, in de buurt van de zenuwbaan van de lumbale sympathicus. Hij controleert met contrastvloeistof of de naald op de juist plaats staat. Als de naald op de juiste plaats staat wordt er verder verdoofd en wordt er fenol bij de zenuwbaan ingespoten om deze te blokkeren.

Radiofrequente(RF)- denervatie

- Een RF- denervatie heeft als doel de pijngeleiding voor langere tijd uit te schakelen. RF- denervatie is een behandeling waarbij de lumbale sympathicus wordt verwarmd door middel van radiofrequente (RF) stroom. De naam denervatie betekent letterlijk 'ontzenuwen' maar in werkelijkheid worden de zenuwen alleen beschadigd. De zenuw kan herstellen.
Zo nodig kan de behandeling herhaald worden. De behandeling gebeurt met behulp van röntgenstralen en onder plaatselijke verdoving.
- De arts brengt één of twee naalden in de lage rug, in de buurt van de lumbale sympathicus. Met contrastvloeistof en een klein elektrisch stroompje controleert hij de positie van de naaldpunt(en). Als de naalden op de juiste plaats staan wordt er verder verdoofd en worden de naaldpunten verwarmd. De zenuwbaan wordt zo verwarmd en gedeeltelijk onderbroken. Hierdoor kunnen de pijnprikkels minder goed worden doorgegeven en zal de pijn afnemen.

Na de behandeling

De dag van de behandeling

- We brengen u na de behandeling met een rolstoel naar de verpleegzaal. Hier verblijft u minimaal een 2 uur ter observatie.
- Bij een behandeling met Fenol moet u een tijd in dezelfde houding blijven zitten voor een optimale werking van het middel.
- De dag van de behandeling kunt u uw activiteiten weer doen zoals u gewend bent, tenzij de pijnspecialist anders met u heeft afgesproken.

Wat kunt u verwachten?

- Na de behandeling kunt u napijn hebben. Deze napijn kan 1 tot 2 weken aanhouden, maar verdwijnt vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstillert innemen, bijvoorbeeld paracetamol (3 tot 4 keer per dag 1000 milligram).
- Na 6 tot 8 weken kunnen we het resultaat van de behandeling beoordelen. Rond deze tijd krijgt u een controleafspraak.
- Soms is een aanvullende behandeling nodig.

Mogelijke complicaties

Zoals bij iedere behandeling, bestaat er ook bij deze behandeling een kleine kans op complicaties:

- Tijdelijk (tot enkele weken) pijn of zwelling in het been. Dit komt door een toegenomen doorbloeding.
- Tijdelijk zenuwpijn of gevoelsvermindering in de lies en/of in het bovenbeen door prikkeling van een zenuw. Aanraking van dit huidgebied kan onaangenaam en pijnlijk zijn.
- Een bloeding.
- Een infectie.
- Krijgt u koorts, of heeft u een bloeding neem dan contact op met uw huisarts of het Pijncentrum.
- Aanprikken van de nier. Deze complicatie is zeer zeldzaam en kan kortdurend bruin gekleurde urine veroorzaken. Waarschuw in dit geval het Pijncentrum.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact

Pijncentrum, locatie Oost

T 020 599 25 13 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

E pijncentrum@olvg.nl

verpleegafdeling A4

Polikliniek Pijnbestrijding, locatie West

T 020 510 81 63 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

E polipijnbestrijding@olvg.nl

Route 05

Pijnbehandelingen locatie West, OK-behandelkamers

T 020 510 86 56 (ma t/m vrij 8.30 – 16.00 uur)

Route 22A

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 27 september 2018, 3413