

Plexus coeliacusblokkade

Blokkade van de plexus coeliacus is een behandeling bij pijn door kanker van de bovenbuikorganen, zoals bijvoorbeeld de alvleesklier.

Een plexus is een netwerk van zenuwen. De plexus coeliacus ligt in de bovenbuikholtte voor de wervelkolom. Dit zenuwnetwerk speelt een belangrijke rol bij pijn door kanker van de bovenbuikorganen, zoals bijvoorbeeld de alvleesklier, maag, of lever. Door blokkade van de plexus coeliacus wordt de pijngeleiding beïnvloed, zodat het pijnsignaal voor langere tijd verminderd kan worden doorgegeven.

Vorbereiding

Bloedverduunners

De pijnspecialist vertelt u als u moet stoppen met uw bloedverduunners.

Zorg dat u weet hoeveel dagen u voor uw behandeling met de bloedverduunners moet stoppen en wanneer u weer mag beginnen hiermee.

Overige medicatie

Deze kunt u gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft gemaakt.

Eten en drinken

De arts vertelt u of u nuchter moet zijn voor de behandeling.

Kleding en sieraden

Draag makkelijk zittende kleding. Wij verzoeken u geen sieraden te dragen in het te behandelen gebied.

Begeleiding naar huis

U mag de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Zorg dat er iemand is om u op te halen na de behandeling.

Ook belangrijk

- Meld voor de behandeling altijd aan de pijnspecialist of verpleegkundige of:
 - u (mogelijk) zwanger bent
 - u allergisch bent voor contrastvloeistof, jodium of medicijnen
 - u een pacemaker of ICD heeft
- Neem voor de behandeling contact op met het Pijncentrum als:
 - u geen pijn of klachten meer heeft
 - u de dag van de behandeling ziek bent of koorts heeft

De behandeling

Met behulp van röntgenstralen brengt de arts een naald in de rug, in de buurt van de plexus coeliacus. Hij controleert met contrastvloeistof of de naald op de juiste plaats staat. Als de naald op de juiste plaats staat wordt er verder verdoofd en wordt er fenol bij het zenuwnetwerk ingespoten om deze te blokkeren. Hierdoor kunnen de pijnprikkels minder goed worden doorgegeven en zal de pijn afnemen. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling

De dag van de behandeling

- We brengen u na de behandeling liggend naar de verpleegzaal. Hier verblijft u minimaal twee uur ter observatie.
- U moet deze twee uur in een half-liggende houding wachten. Dit helpt de behandeling zo goed mogelijk te laten werken.
- De dag van de behandeling kunt u uw activiteiten weer doen zoals u gewend bent.

Wat kunt u verwachten?

- Na de behandeling kunt u napijn hebben. Deze napijn kan 1 tot 2 weken aanhouden, maar verdwijnt vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol (3 à 4 keer per dag 1000 milligram).
- Het effect van de behandeling is pas na een of twee dagen na de blokkade duidelijk. Het is echter ook mogelijk dat de pijn meteen na de behandeling verdwenen is. Bij de meeste patiënten is de pijn na de behandeling veel minder. Een plexus-coeliacusblokkade werkt enkele maanden lang. Komt de pijn terug, dan is een nieuwe blokkade mogelijk.

Mogelijke complicaties en bijwerkingen

Zoals bij iedere behandeling bestaat er een kleine kans op complicaties:

- Een bloeding
- Een infectie. Krijgt u koorts? Neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.
- De eerste weken na de behandeling kunt u wat sneller duizelig worden bij snel overeind komen. Dit gaat vanzelf weer over.
- Heel soms kan de bloeddruk ineens heel laag worden. De arts kan dit goed behandelen.
- Aanprikken van de nier. Deze complicatie is zeer zeldzaam en kan kortdurend bruin gekleurde urine veroorzaken. Waarschuw in dit geval het Pijncentrum.
- Er is een zeer kleine kans dat de long wordt aangeprikt. Wordt u na de behandeling kortademig, neem dan contact op **de Spoedeisende Hulp!**
- Toename van pijnklachten. Zeer zelden ontstaan door de behandeling meer pijnklachten.
- In uiterst zeldzame gevallen kan er een dwarslaesie met gedeeltelijke of gehele verlamming van beide benen optreden. Dit komt gelukkig bijna nooit voor.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact

Pijncentrum, locatie Oost

T 020 599 25 13 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

E pijncentrum@olvg.nl

verpleegafdeling A4

Polikliniek Pijnbestrijding, locatie West

T 020 510 81 63 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

E polipijnbestrijding@olvg.nl

Route 05

Pijnbehandelingen locatie West, OK-behandelkamers

T 020 510 86 56 (ma t/m vrij 8.30 – 16.00 uur)

Route 22A

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 2 oktober 2018, 3422