

# Weefselexpansie

**Bij weefselexpansie rekt men met behulp van een ballon, een tissue expander, een gedeelte van de huid uit. Vervolgens wordt de uitgerekte huid gebruikt als bedekking van aangrenzende beschadigde huid. De beschadigde huid kan bijvoorbeeld een litteken of een huidtumor zijn.**

Ook kan weefselexpansie worden toegepast bij mamma-reconstructie waarbij de huid naast het amputatielitteken moet worden opgerekt. Deze methode is toe te passen in bijna ieder deel van het lichaam. Soms is het nodig de ingreep te herhalen. Het is goed zich te realiseren dat soms extra littekens moeten worden gemaakt, en dat er ook altijd littekens blijven bestaan.

Behoudens de normale risico's van een plastisch chirurgische operatie kan het zijn dat de ballon door de patiënt niet wordt verdragen en tevens kan er ook weefselversterf optreden waarbij de prothese naar buiten kan komen. De ballon wordt met een zoutoplossing, fysiologisch zout, door middel van een slangetje met ventiel opgepompt of door de ballon aan te prikken met een naald en deze zo te vullen.

In een enkel geval kan een opgepompte weefselexpander weer leeg lopen, bijvoorbeeld als het ventiel of slangetje niet goed functioneert. Ook kan de ballon zelf lekken. In dit geval moet er een nieuwe weefselexpander worden ingebracht door middel van een nieuwe operatie. Ook bij de andere complicaties zijn er meestal extra operaties nodig om de ontstane situatie te verbeteren.

## Voor de behandeling

### Nuchter zijn

Uit veiligheidsoverwegingen moet u voor de operatie nuchter zijn. Dit geldt voor alle vormen van verdoving door de anesthesioloog.

Dat betekent dat u voor de operatie vanaf middernacht niets mag eten. Wel mag u tot 2 uur voor uw operatie 2 glazen heldere vloeistof drinken, zoals:

- water
- limonade
- vruchtensap zonder vruchtvlees
- thee of koffie met suiker, maar zonder melk.

Als u zich niet aan deze afspraken houdt, kan uw operatie niet op de afgesproken tijd doorgaan. Soms zal de anesthesioloog met u afspreken dat u langere tijd voorafgaande aan de operatie niet mag drinken. Dit kan het geval zijn naar aanleiding van uw gezondheidstoestand.

## **De verdoving**

De operatie wordt uitgevoerd onder narcose.

## **De behandeling**

Via een snede in de huid wordt een onopgeblazen ballon met onder de huid aangebracht. De plaats ligt vlak naast het gebied waar normale huid aanwezig is of waar extra huid nodig is.

Nadat de wonden zijn genezen wordt er een begin gemaakt met het opvullen van de ballon. De plastisch chirurg spuit door de huid via het ventieltje een zoutoplossing in de ballon. De ballon zet uit en rekt de huid mee. Hierna heeft u een paar uur lang wat ongemak. Ter plaatse van de ballon ontstaat dus bij elke inspuiting een toenemende zwelling. Deze kan storend zijn, maar is niet te vermijden.

Wanneer de huid voldoende is opgerekt, wordt in een tweede operatie de ballon verwijderd en wordt de extra huid gebruikt voor het geplande doel. Het herstel van de tweede operatie is niet in zijn algemeenheid te beschrijven, het is mede afhankelijk van de plaats en de omvang van het behandelde gebied.

## **Duur van de behandeling**

De opnamen in het ziekenhuis duren meestal enkele dagen, maar in principe zijn ten minste twee operaties nodig. De poliklinische behandeling, het opvullen van de ballon en de controles, neemt enkele maanden in beslag.

## **Resultaten**

Zonder meer mag worden gesteld dat men met gebruik van weefseleexpanders resultaten kan verkrijgen die op een andere manier niet te verwezenlijken zijn. Helaas is gedeeltelijk of geheel mislukken van de behandeling niet altijd uit te sluiten.

## **Kans op complicaties**

Esthetische en Plastische Chirurgie is geen exacte wetenschap. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij u niet geven. Complicaties kunnen altijd optreden, zoals narcoseproblemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf, gevoelloze huid, etc.

Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen die of door uw verzekering vergoed moeten worden of door uzelf.

Heeft u nog vragen, stel die dan gerust aan de arts of verpleegkundige. Of bel met de afdeling Plastische Chirurgie.

## Vragen?

### U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op [www.olvg.nl](http://www.olvg.nl) Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op [www.olvg.nl/zorgnota](http://www.olvg.nl/zorgnota)

### Contact

#### verpleegafdeling Plastische Chirurgie B5, locatie Oost

T 020 599 30 88 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar)

*Bezoek: 15.30 – 20.00 uur*

#### verpleegafdeling Plastische Chirurgie, locatie West

T 020 510 84 14 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar) **A4**

T 020 510 84 34 (7 dagen per week, dag en nacht bereikbaar) **B4**

Route 41

*Bezoek 11.00 -12.00 uur en van 16.30 - 19.30 uur*

#### Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?

Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de OK-planner Plastische Chirurgie, locatie West

T 020 510 81 65

Uw afspraak is op \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ om \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ uur

**Oost**  
Oosterpark 9  
1091 AC Amsterdam

**West**  
Jan Tooropstraat 164  
1061 AE Amsterdam

**Spuistraat**  
Spuistraat 239 A  
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: [www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden](http://www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden)

Klacht of opmerking: [www.olvg.nl/klacht](http://www.olvg.nl/klacht)

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 22 november 2018, 2918