

Ajmalinetest

U heeft een afspraak voor een ajmalinetest. Met deze test onderzoeken we of u het Brugada Syndroom heeft. Dit is een aandoening waarbij de elektrische activiteit van het hart is verstoord. Hierdoor is er een verhoogd risico op ernstige hartritmestoornissen.

Uw arts heeft een ajmalinetest aangevraagd. Aanleidingen kunnen meestal zijn:

- U heeft een kortdurende bewusteloosheid of hartstilstand gehad zonder directe verklaring
- Iemand uit uw familie is plotseling zonder duidelijke reden op jonge leeftijd overleden
- Familieleden zijn dragers van het syndroom van Brugada
- Er is van u een hartfilmpje (ECG) gemaakt met daarop specifieke afwijkingen die bij het syndroom van Brugada zouden kunnen passen.

Wat neemt u mee?

- Een geldig identiteitsbewijs
- Uw actueel medicatie overzicht. U kunt deze verkrijgen bij uw apotheek

Het onderzoek

Vorbereiding

- Op de dag van het onderzoek moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u vanaf 00.00 uur niet meer mag eten en drinken. U mag wel tot 2 uur voor het onderzoek uw medicatie innemen met een klein beetje water. Heeft u diabetes (suikerziekte)? Neem dan na de behandeling uw tabletten in of spuit uw insuline in overleg met de arts.
- Meldt u zich op de Hartbewaking (afdeling C3) op de afgesproken tijd.
- U wordt aangesloten aan de hartmonitor. We maken meerdere hartfilmpjes. U krijgt een infuus in uw arm. Er wordt bloed afgenomen. De uitslagen hiervan zijn na een uur bekend. Als het bloed niet afwijkt, kan het onderzoek beginnen.

Het onderzoek

- Een arts-assistent Cardiologie en een gespecialiseerd verpleegkundige voeren het onderzoek uit.
- Met de ajmalinetest kunnen we een eventueel bestaand syndroom van Brugada vaststellen.
- We dienen het medicijn ajmaline via het infuus toe.
- We observeren tegelijkertijd het ECG.
- Tijdens de test meten we regelmatig uw bloeddruk.
- We bekijken voortdurend uw hartritme en hartfilmpjes.
- De test is klaar als:

- Het maximale aantal milligram ajmaline is toegediend (op basis van uw gewicht)
- Hartritmestoornissen optreden
- De diagnose is gesteld

Duur van het onderzoek

De test zelf duurt ongeveer 15 minuten. Daarna observeren we uw hartritme nog 2 uur.

Mogelijke bijwerkingen

- Hoofdpijn
- Misselijkheid
- Dubbel/wazig zien
- Benauwdheidsklachten
- Nervositeit
- Warm gevoel in hals, gezicht en schaamstreek
- Dik gevoel in tong en lippen
- Ritmestoornissen

Doordat ajmaline binnen enkele minuten is uitgewerkt, verdwijnen deze klachten ook weer snel.

Na het onderzoek

- We bewaken uw hartritme nog 2 uur aan de monitor
- U mag weer eten als het hartfilmpje (weer) normaal is
- de arts-assistent geeft u aansluitend aan het onderzoek een uitslag of zo nodig een polikliniekafspraak.

Waren er tijdens of na het onderzoek hartritmestoornissen zichtbaar of bepaalde veranderingen op het hartfilmpje te zien? Dan kan het nodig zijn dat u wordt opgenomen. Als er geen afwijkingen waren, mag u weer alles doen wat u gewend bent.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact

Afdeling Hartbewaking, locatie Oost

T 020 599 23 05 (7 dagen per week, 24 uur per dag)
C3

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 24 juni 2019, foldemr.3936