

Punctie en/of drainage

CT geleid

Een punctie is het prikken met een dunne naald om cellen en/of vocht op te zuigen. Een drainage is het inbrengen van een dun slangetje, een drain, om vocht naar buiten te laten lopen. De cellen of het vocht worden in het laboratorium onderzocht. Bij een CT geleide punctie en/of drainage maakt de radioloog gebruik van een computertomogram om de juiste punctieplaats te vinden.

Verdoving

Om het onderzoek goed en pijnloos uit te voeren, krijgt u een lokale verdoving. door de behandelend arts lokaal verdoofd.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger, neem dan voor nader overleg contact op met de afdeling Radiologie. Een radiologisch onderzoek kan in de eerste maanden van de zwangerschap namelijk schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het ongeboren kind.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer een halfuur tot een uur. Voor het onderzoek wordt u een dag in het ziekenhuis opgenomen.

Voor het onderzoek

Medicijngebruik

Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, moet u daar in overleg met de arts van tevoren mee stoppen.

Het onderzoek

Afhankelijk van de bij u geconstateerde afwijking wordt er een punctie of drainage verricht.

Punctie

- De punctieplaats wordt gemarkeerd en verdoofd door middel van een injectie.

- Daarna wordt afhankelijk van het soort punctie een aantal malen geprikt, meestal tot drie keer. Op deze wijze worden cellen en/of vocht opgezogen, die meestal in het laboratorium worden onderzocht.

Drainage

- De punctieplaats wordt gemarkeerd en verdoofd door middel van een injectie.
- Daarna wordt er geprikt en een slangetje over de naald heen geschoven tot in de afwijking. Het naaldje wordt weer verwijderd.
- Aan de slang wordt een zakje vastgemaakt.
- Belangrijk is dat de slang niet verschuift, daarom is die goed op de huid bevestigd.
- Het geheel moet enkele dagen tot weken blijven zitten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek blijft u nog een paar uur ter controle op de afdeling Dagbehandeling en wordt er na de ingreep bij een longpunctie, na een uur nog een controle röntgenfoto van hart en longen gemaakt.

De uitslag

Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken.

Complicaties

Er bestaat een kleine kans op een bloeding of een infectie. Neemt u daarom bij koorts, hevige pijn of bloedverlies contact op met het ziekenhuis. Bij een longpunctie is het mogelijk dat u een klein beetje bloed ophoest. Ook een klaplong kan een complicatie zijn.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online www.olvg.nl/radiologie

Contact

afdeling Radiologie, locatie West - Route 15

T 020 510 88 98 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

E radiologie.afdeling@olvg.nl

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 7 januari 2020, foldernr.2704