

# Orale glucose tolerantietest voor acromegalie

De orale glucose tolerantietest wordt uitgevoerd bij een vermoeden op overmatige productie van het hormoon 'groeihormoon' door de hypofyse, een klier in de hersenen. Groeihormoon is een hormoon dat tijdens de kinderleeftijd zorgt voor groei. Als de hypofyse teveel groeihormoon maakt als iemand al is uitgegroeid, wordt dat gekenmerkt door de groei van handen en voeten.

Om te bevestigen dat de hypofyse inderdaad teveel groeihormoon maakt kan een orale glucose tolerantietest worden uitgevoerd. Tijdens deze test krijgt u een suikeroplossing te drinken. Normaal gesproken zou de hypofyse hierop moeten reageren en minder groeihormoon gaan maken.

Indien er sprake is van overmatige productie van groeihormoon zoals bij acromegalie, zal de hypofyse niet op de suikeroplossing reageren en blijft het groeihormoon in het bloed hoog of daalt het onvoldoende.

## Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 3 uur.

## Voor het onderzoek

**De hoeveelheid groeihormoon in het bloed wordt beïnvloed door eten. Het is daarom belangrijk dat u vanaf middernacht niet meer eet of drinkt. Ook kauwgom is niet toegestaan.**

## Medicijngebruik

Mocht u medicijnen gebruiken, overlegt u dan voor de test met de arts of deze wel of niet ingenomen mogen worden.

## Het onderzoek

Voorafgaand aan de test krijgt u een infuus ingebracht op de hand of arm. Dit infuus blijft tijdens het hele onderzoek zitten. Zo kunnen wij bloed afnemen zonder dat u er veel last van heeft. Voorafgaand aan de test wordt twee keer bloed afgenomen via het infuus. Daarna krijgt u een suikerhoudend drankje te drinken.

Vervolgens wordt op een aantal vaste tijdstippen vijf keer bloed afgenomen via het infuus. Tijdens de test is het belangrijk om rustig in de stoel te blijven zitten, uw arts zal dit met u bespreken. Na de laatste bloedafname is de test afgelopen.

## Na de test

Na de test wordt het infuusnaaldje verwijderd.

## De uitslag

Het Klinisch Laboratorium stuurt de uitslag van de test naar uw arts.

## Bijwerkingen

Misselijkheid kan een bijwerking van de test zijn.

## Vragen?

### U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op [www.olvg.nl](http://www.olvg.nl) Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op [www.olvg.nl/zorgnota](http://www.olvg.nl/zorgnota)

### Contact

#### Klinisch Laboratorium, locatie West

T 020 510 88 97 (ma t/m vrij 08.00 - 16.30 uur)

Route 04

#### verpleegafdeling Dagbehandeling, locatie West

T 020 510 82 33

Route 31

Uw afspraak is op \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ om \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ uur

Oost  
Oosterpark 9  
1091 AC Amsterdam

West  
Jan Tooropstraat 164  
1061 AE Amsterdam

Spuistraat  
Spuistraat 239 A  
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: [www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden](http://www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden)

Klacht of opmerking: [www.olvg.nl/klacht](http://www.olvg.nl/klacht)

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 12 februari 2020, foldernr.2632