

# instructies bij langdurig gebroken vliezen

Als bij een zwangere vrouw de vliezen meer dan 24 uur gebroken zijn, spreken we van langdurig gebroken vliezen. Dit is een reden om te bevallen in het ziekenhuis in verband met het risico van infectie.

## Controles bij langdurig gebroken vliezen

Als uw vliezen meer dan 24 uur gebroken zijn, wordt er in OLVG een CTG (cardiotocogram) gemaakt, een registratie van de harttonen van de baby. Ook wordt uw temperatuur gecontroleerd. Zijn deze controles goed dan gaat u weer naar huis.

## Inleiden van de bevalling

Als de weeën niet spontaan op gang komen nadat de vliezen zijn gebroken, wordt de bevalling ingeleid. Dit gebeurt tussen 48 en 72 uur nadat de vliezen zijn gebroken. Informatie over het inleiden van een bevalling vindt u in de folder 'Inleiden van de bevalling'.

## Instructies voor thuis

- Controleer uw temperatuur 's morgens, 's middags, 's avonds en voor het slapen gaan (bij voorkeur rectaal)
- Ga niet in bad
- U kunt beter geen geslachtsgemeenschap hebben

## Neem contact op met de verloskamers als:

- Uw temperatuur hoger is dan 37,5 °C is
- U vruchtwater verliest dat groen/geel is
- U veel bloedverlies heeft (meer dan bij een menstruatie)
- U tenminste om de vier minuten gedurende een uur weeën heeft (tenzij u andere instructies heeft gekregen)
- U ongerust bent

## Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Verloskunde via ☎ 020 599 30 09 of kijk op [www.olvg.nl](http://www.olvg.nl)

Algemene voorwaarden: [www.olvg.nl/algemene\\_voorwaarden](http://www.olvg.nl/algemene_voorwaarden)

Klacht of opmerking: ga naar [www.olvg.nl/klacht](http://www.olvg.nl/klacht)

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, april 2017\0341