

Histamine provocatietest longziekten

Met een provocatietest meten we de gevoeligheid van de luchtwegen. Dit onderzoek gebeurt door een longfunctie-analist van de afdeling Longfunctie.

Voor het onderzoek

Eten en drinken

Voor het onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U mag dus gewoon eten en drinken.

Ontspannen

Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Zorg daarom dat u op tijd komt!

Gebruikt u medicijnen?

Als u medicijnen gebruikt, controleer dan of deze in onderstaand overzicht staan. U mag deze een aantal dagen voor het onderzoek niet innemen.

Als u de medicijnen toch gebruikt heeft, bel dan met de polikliniek Longziekten voor overleg en een eventuele nieuwe afspraak.

Kortwerkende luchtwegverwijders (per inhalatie)

12 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken

- Aerolin
- Airomir
- Atrovent/ Ipratropiumbromide
- Berodual

- Bricanyl
- Combivent
- Ventolin / Salbutamol

Langwerkende luchtwegverwijders (per inhalatie)

48 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken

- Aerivo
- AirFluSal Forspiro

- Atimos
- Budesonide
- Bufoler Easyhaler
- Busalair
- Daxas
- Duaklir Genuair
- Duoresp Spiromax
- Eklira Genuair
- Elpenhaler
- Fluticason
- Flutiform
- Foradil
- Foster
- Onbrez
- Oxis
- Relvar Ellipta
- Salmeterol
- Semprex
- Seretide
- Serevent
- Singulair
- Striverdi
- Symbicort
- Theolair retard
- Ultibro
- Unilair

168 uur (1 week) voor het onderzoek niet meer gebruiken

- Anoro
- Incruse Ellipta
- Relegy
- Seebri
- Spiolto
- Spiriva
- Tiotrus Zonda
- Trimbow
- Ultibro
- Xoterna

Antihistaminica (anti-allergiemedicatie)

72 uur voor het onderzoek niet meer gebruiken

- Aerius/ Allerfre
- Atarax
- Brontine
- Cinnarizine
- Claritine

- Desloratadine
- Dymista neusspray
- Fenistil
- Fexofenadine
- Hydroxine
- Kestine
- Mebhydroline
- Mistalin
- Mizollen
- Navicalm
- Periactin
- Phenergan
- Polarimine(repe)
- Promethazine
- Semprex
- Tavegil
- Telfast
- Terfenadine
- Tinset
- Triludan
- Xyzal/ Levocetirizine
- Zaditen
- Zyrtec

3 weken voor het onderzoek niet meer gebruiken

- Hismanal

Histamine provocatietest

Deze test meet de gevoeligheid van de luchtwegen met behulp van histamine. Dit is een prikkelende, maar onschadelijke stof, die ook door het lichaam wordt aangemaakt.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt gemiddeld één uur. Dit is afhankelijk van de dosis histamine waarop u reageert.

Het onderzoek

U krijgt een mondstuk in de mond. Dit mondstuk is aangesloten op de spirometer. Om te zorgen dat u alleen door uw mond ademt krijgt u een klemmetje op uw neus. U gaat nu, onder begeleiding van de longfunctie-analist(e), een aantal ademhalingsoefeningen doen.

Na deze test met de spirometer ademt u de histamine in. De longfunctie-analist(e) verhoogt steeds de dosis histamine. Na elke verhoging van de dosis wordt met de spirometer gekeken of uw luchtwegen hebben gereageerd op de histamine. Als uw luchtwegen overgevoelig zijn, kunt u last krijgen van hoesten of een benauwd gevoel. De test wordt beëindigd wanneer de

longfunctie 20 procent of meer is gedaald. Dan krijgt u een medicijn om de longfunctie te herstellen. Na een kwartier moet u nog een keer in de spirometer blazen.

Bijverschijnselen

Na het onderzoek kunt u lichte keelpijn hebben of prikkelhoest. Het onderzoek is belastend vanwege het vele blazen, maar is niet gevaarlijk.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt door een longarts beoordeeld. Met uw behandelend arts heeft u vóór het onderzoek afgesproken waar en wanneer u de uitslag te horen krijgt. De analist(e) kan u daarover geen mededelingen doen.

Naar huis

Na het onderzoek of de onderzoeken mag u gewoon naar huis. Gebruik van eigen of openbaar vervoer is geen probleem.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online www.olvg.nl/longgeneeskunde

Contact

polikliniek Longgeneeskunde, locatie Oost – P2

T 020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

E longgeneeskunde@olvg.nl

polikliniek Longgeneeskunde, locatie West – route 4

T 020 510 88 92 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

E polilongziekten-west@olvg.nl

Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?

Bel zo snel mogelijk met de afdeling! Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Uw afspraak is op _____ - _____ - _____ om _____:_____ uur

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 8 juli 2020, foldemr.2699