

.....

Trommelvliesbuisjes of middenoorbeluchting bij kinderen

MOB

Trommelvliesbuisjes worden geplaatst als uw kind last heeft van gehoorverlies en/of middenoorontstekingen.

Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld problemen op school ontstaan, of een achterstand in de spraak- en/of taalontwikkeling. De buisjes zorgen ervoor dat vocht uit de trommelholte naar de keelholte wordt afgevoerd. Na zo'n zes tot twaalf maanden vallen ze vanzelf uit het trommelvlies, waarna de gaatjes zich spontaan sluiten. Vertel uw kind zo goed mogelijk van tevoren wat er gaat gebeuren.

Uw afspraak

U heeft een afspraak voor de behandeling op

Datum om uur

Als uw kind koorts of een infectieziekte heeft, kan de behandeling niet doorgaan. Graag telefonisch melden bij de polikliniek KNO. Een lichte verkoudheid zonder koorts is geen probleem.

Verdoving

Het kind krijgt een kapje over neus en mond. Het kapje ruikt vies. Het kind wordt draaiërig en valt dan in slaap. Het is niet raadzaam (i.v.m. inademen narcosemiddel) om hierbij te zijn als u zwanger bent. Neem in dat geval nog iemand mee om bij uw kind te blijven.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt slechts enkele minuten en wordt met behulp van een microscoop verricht via de gehoorgang.

Voor de behandeling

Nuchter

Uit veiligheidsoverwegingen moet uw kind voor de operatie nuchter zijn.

Dit geldt voor alle vormen van verdoving door de anesthesioloog. Dat betekent dat uw kind voor de operatie vanaf middernacht niets mag eten. Wel mag uw kind tot 2 uur voor de operatie 2 glazen heldere vloeistof drinken, zoals:

- water
- limonade
- thee of koffie met suiker maar zonder melk

Als u zich niet aan deze afspraken houdt, kan de operatie niet op de afgesproken tijd doorgaan.

Medicijngebruik

Geef uw kind gedurende een week voor de ingreep geen aspirine of aspirine-houdende middelen, omdat deze de bloedstolling beïnvloeden. Gebruikt uw kind medicijnen via uw huisarts of specialist? Laat deze dan met een klein slokje water innemen. Niet met melk! Gebruikt uw kind medicijnen voor astma, geef deze dan zoals gewoonlijk.

Adviezen

Trek het kind geen mooie kleding aan. Neem een extra onderbroekje en T-shirtje mee. Eventueel lang haar kunt u het best in een staartje doen. Een ziekenhuis is geen prettige omgeving voor kinderen. Neemt u daarom geen andere kinderen mee. Zo kunt u ook alle aandacht besteden aan uw zieke kind.

De behandeling

In de wachtkamer kunt u uw kind uitkleden. Sokjes en ondergoed mogen aanblijven. We geven uw kind een drankje te drinken dat zorgt voor minder speekselvorming en vervolgens een zetpil paracetamol. Na het inwerken van het drankje en de paracetamol wordt uw kind geroepen voor de behandeling. U mag mee naar binnen om het gerust te stellen. Het kind krijgt het kapje voor de verdoving. Als uw kind slaapt, kunt u naar de uitslaapkamer gaan. Intussen vindt de behandeling plaats.

Na de behandeling

Op de afdeling

Uw kind wordt snel weer wakker en in een bedje naar u toe gereden.

Naar huis

U mag al snel na de behandeling met uw kind naar huis.

Weer thuis

U hoeft zich niet ongerust te maken over lichte oorpijn of een matige temperatuurverhoging. Door het plaatsen van buisjes kan soms een geringe oorbloeding ontstaan. De bloeding houdt na twee dagen spontaan op.

Complicaties en contact

Als het oor na een week nog loopt of gaat lopen, neem dan contact op met de polikliniek.

Pijnbestrijding

Bij pijn mag uw kind om de zes uur één paracetamolzetpil, maximaal vier per etmaal. Het aantal milligrammen van de zetpil hangt af van de leeftijd en het gewicht van uw kind:

- 3-12 maanden/gewicht 5,5-10 kg: per keer een zetpil van 120 mg.
- 1-2 jaar/gewicht 10-12,5 kg: per keer een zetpil van 240 mg.
- 2-4 jaar/gewicht 12,5-17 kg: per keer een zetpil van 240 mg.
- 4-6 jaar/gewicht 18-22 kg: per keer een zetpil van 500 mg.
- 6-9 jaar/gewicht minder dan 35 kg: per keer een zetpil van 500 mg.

De zetpillen kunt u kopen bij de drogist of de apotheek. Gebruik **geen** kinderaspirine zoals sinaspril!

Weer naar school

Uw kind kan de volgende dag weer naar de crèche of school.

Zwemmen

Als uw kind geen oorpijn heeft of een loopoor (vocht uit het oor), mag uw kind na de ingreep gewoon zwemmen, douchen of in bad. Het is niet nodig om oordoppen te gebruiken.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online

- www.olvg.nl/kno

Contact

polikliniek behandelkamers Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), locatie West

T 020 510 88 94 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

Route 22B

Kunt u niet komen of u wilt een andere afspraak maken?

Bel zo snel mogelijk met de afdeling! Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 22 juli 2020, foldernr.2849