

# Ontsteking wortelpunt tand of kies


U heeft een ontsteking aan de wortelpunt van uw tand of kies. Meestal heeft u bij uw tandarts hiervoor al een wortelkanaalbehandeling ondergaan. Soms kan toch een extra behandeling (apexresectie) nodig zijn.

## Hoe ontstaat een ontsteking aan de wortelpunt?


Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en een wortel. De kroon is het gedeelte dat boven het tandvlees zichtbaar is. De wortel zit onder het tandvlees in de kaak verankerd. In iedere wortel loopt een kanaal: het wortelkanaal. Dit kanaal is gevuld met zenuwvezels en kleine bloedvaten: de pulpa.

Door tandbederf, een lekkende vulling of door beschadiging kan deze pulpa ontstoken raken. Deze ontsteking wordt veroorzaakt door bacteriën. De pulpa zal uiteindelijk afsterven en de bacteriën kunnen dan een ontsteking van het kaakbot rondom de wortelpunt veroorzaken (zie figuur 1). Op een röntgenfoto is die ontsteking vaak goed te zien.

## Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en een wortel



Figuur 1. Tandbederf kan een ontsteking rondom de wortelpunt veroorzaken.



Figuur 2. Ondanks een goede wortelkanaalbehandeling blijft soms een ontsteking rondom de wortelpunt bestaan.


## Waarom een behandeling van een ontstoken wortelpunt?

Somt lukt het niet om met een wortelkanaalbehandeling de ontsteking aan de wortelpunt tot rust te krijgen (zie figuur 2). Het kan dan zinvol zijn de wortelkanaalbehandeling eerst opnieuw te laten uitvoeren. Als ook deze tweede ingreep geen resultaat heeft, kan een behandeling van de wortelpunt (apexresectie) een oplossing zijn.

## De behandeling

- De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving.
- De wortelpunt en het ontstoken weefsel worden vervolgens verwijderd.
- Daarna wordt het wortelkanaal van de (ingekorte) wortel gevuld (zie figuur 3).

### Het tandvlees wordt gehecht.



Figuur 3 Na een apexresectie zijn de wortels ingekort en de kanalen extra afgevuld.

## Duur van de behandeling

De duur van de behandeling hangt af van het aantal te behandelen kanalen en wortels. Gemiddeld duurt de behandeling 30 minuten.

## Na de behandeling

Het duurt een paar uur voordat de verdoving helemaal is uitgewerkt.

De behandeling is geslaagd als er op termijn geen klachten meer zijn van pijn of ontsteking. Het kaakbot groeit dan weer tegen de ingekorte wortels aan. Dit controleren we met röntgenfoto's; meteen na de ingreep en een half jaar daarna.

De eerste dagen na de behandeling kunt u klachten hebben van pijn, zwelling en koorts. Lees meer in de folder 'na een kaakchirurgische behandeling'.

# Vragen?

## U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op [www.olvg.nl](http://www.olvg.nl) Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op [www.olvg.nl/zorgnota](http://www.olvg.nl/zorgnota)

## Meer informatie online

[www.olvg.nl/mka-chirurgie](http://www.olvg.nl/mka-chirurgie)

## Contact

### polikliniek Mondziekten, Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie Oost

T 020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)  
E [kaakchirurgie@olvg.nl](mailto:kaakchirurgie@olvg.nl)  
P4

### polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie West

T 020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)  
E [kaakchirurgie@olvg.nl](mailto:kaakchirurgie@olvg.nl)  
Route 01

Oost  
Oosterpark 9  
1091 AC Amsterdam

West  
Jan Tooropstraat 164  
1061 AE Amsterdam

Spuistraat  
Spuistraat 239 A  
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: [www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden](http://www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden)

Klacht of opmerking: [www.olvg.nl/klacht](http://www.olvg.nl/klacht)

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 26 augustus 2020, foldernr.0160-NL