

Dubbel-J katheter

urineleider openhouden

Een dubbel-J katheter is een inwendig slangetje (katheter) dat in de urineleider geplaatst wordt om de doorgang van de nier naar de blaas open te houden (zie afbeelding).


De dubbel-J katheter wordt ingebracht om de urineleider open te houden. Het doel is om de urine-afvloed van de nier naar de blaas te kunnen garanderen.

Een dubbel-J wordt meestal na een ingreep aan de urineleider ingebracht. Soms is het inbrengen van een dubbel-J een op zichzelf staande ingreep, die plaatsvindt op de operatiekamer.

Omdat u op de operatiekamer onder verdoving bent, merkt u van het inbrengen van de dubbel-J katheter niets.

Mogelijke bijverschijnselen en complicaties

- De krul aan het uiteinde in de blaas kan de blaas prikkelen. U kunt daardoor na de ingreep last krijgen van een gevoel van aandrang, soms zelfs pijn, vaak plassen, een branderig gevoel en/of bloedverlies bij het plassen. De klachten kunnen lijken op een blaasontsteking. Dit zijn over het algemeen normale reacties van de blaas op de aanwezigheid van de katheter.
- Het kan echter ook zijn dat er werkelijk een ontsteking door bacteriën is ontstaan. Gewoon urineonderzoek kan dit verschil helaas niet aantonen. Bij twijfel moet u daarom contact opnemen met de polikliniek Urologie.
- Ook kunt u tijdens het plassen een drukkend gevoel krijgen in de nier, doordat de urine dan via de dubbel-J terugloopt naar de nier.



Wanneer contact opnemen?

Neem telefonisch contact met ons op bij een van de volgende problemen:

- koorts boven de 38,5°C
- koliekpijn die niet goed op pijnstilling reageert
- teveel klachten van de blaasontsteking (er kan dan eventueel medicatie voorgeschreven worden)

Overdag belt u met de polikliniek Urologie, 's avonds of in het weekend met verpleegafdeling B7, locatie Oost.

Verwijderen van de katheter

Na uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u een afspraak 1 tot 3 weken na de operatie om de dubbel-J katheter te laten verwijderen. Dat gebeurt poliklinisch tijdens een kijkonderzoek van de blaas (cystoscopie). Het verwijderen van de dubbel-J katheter is een korte en eenvoudige ingreep en gebeurt door middel van een cystoscopie.

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota. Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online

- www.olvg.nl/urologie

Contact

polikliniek Urologie, locatie Oost

T 020 510 86 94 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
E urologie@olvg.nl
P3

polikliniek Urologie, locatie West

T 020 510 86 94 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
E urologie@olvg.nl
Route 16

verpleegafdeling Urologie, locatie Oost

T 020 599 27 03 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)
T 020 599 30 73 (buiten kantoor tijden)
B7

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 8 januari 2021, foldernr.2232