

Ontwateringstherapie bij chronisch hartfalen

behandeling met diuretica

U bent in behandeling vanwege hartfalen en u houdt vocht vast. Teveel vocht kan vervelende klachten veroorzaken zoals benauwdheid. Om de klachten te verminderen, krijgt u een infuus met een plasmiddel (diuretica).

Plasmiddelen (diuretica) zorgen ervoor dat je overtollig vocht kwijtraakt. Dit doen ze door de aanmaak van urine in de nieren te stimuleren. Artsen schrijven plasmiddelen vaak voor bij hoge bloeddruk en hartfalen. Door deze medicijnen komt er minder druk op de bloedvaten te staan.

De behandeling

Vorbereiding

Voor de toediening van een infuus met plasmiddel (Furosemide of Bumetanide) maken wij een afspraak met u op de Cardio Lounge. U hoeft niet nuchter te zijn of bepaalde voorbereidingen te treffen.

Neem een boek of tijdschrift mee voor tijdens de behandeling. Er is wifi zodat u eventueel uw mobiele telefoon, tablet of laptop kunt gebruiken. U mag ook een naaste meenemen om u gezelschap te houden tijdens de behandeling (maximaal 1 persoon).

Behandeling via infuus

- U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de 3e etage bij de Cardio Lounge (route 36), locatie West.
- Wij wegen uw gewicht zodat we een uitgangswaarde hebben.
- Op de Cardio Lounge neemt u plaats op een speciale stoel. De verpleegkundige brengt via een ader het infuus in.
- Via dit infuus krijgt u het medicijn langzaam ingespoten.
- De behandeling duurt minstens 6 uur. Als na 6 uur niet het gewenste resultaat is bereikt, komt u de volgende dag terug voor dezelfde behandeling.
- Moet u plassen tijdens het infuus? Dan kunt u gewoon naar het toilet gaan.

Als uw bloeddruk na de behandeling te laag is, bestaat de kans dat u in het ziekenhuis moet blijven.

Na de behandeling

Na de behandeling wegen wij u nog een keer om het verschil te meten. Als de behandeling goed is verlopen, mag u direct naar huis. Na een behandeling met diuretica mag u gewoon autorijden of reizen met het openbaar vervoer.

U krijgt een vervolgspraak mee via de secretaresse van de Lounge dagbehandeling.

Bijwerkingen

Het medicijn Furosemide of Bumetanide kan tijdens het toedienen of als u thuis bent bijwerkingen veroorzaken zoals:

- Spierzwakte in de bovenbenen of armen
- Lage bloeddruk
- Hartkloppingen
- Maag en/of buikklachten

Eventuele klachten gaan meestal vanzelf over. Neem contact op met het ziekenhuis als u vragen heeft, of als u zich zorgen maakt.

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota. Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online

- www.olvg.nl/hartcentrum

Contact

Lounge dagbehandeling Cardiologie, locatie West

T 020 510 82 63 (werkdagen 8.00 – 15.30 uur)

Route 31

Hartfalenverpleegkundige, locatie Oost en West

T 020 599 23 57 (10.30 - 12.00 uur en 14.30 - 16.00 uur)

E hartfalen@olvg.nl

Buiten kantoortijden of bij noodgevallen of acute situaties bellen naar uw huisarts, huisartspost of 112

Notities

U kunt deze pagina gebruiken om:

- Vragen te noteren die u bij uw volgende afspraak aan uw arts of consulent hartfalen wilt stellen.
- Afspraken te noteren die u heeft gemaakt met uw arts of consulent hartfalen.
- Notities te maken over uw medicijngebruik, uw gewicht of uw algemene gezondheid.

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 29 juni 2021, foldemr.3803