

Coloscopie bij kinderen op de operatiekamer (OK)

Een coloscopie is een inwendig onderzoek van de dikke darm. Het onderzoek gebeurt met een buigzame (flexibele) slang, de endoscoop. Deze wordt via de anus ingebracht tot en met de overgang naar de dunne darm.

De voorbereiding van de darmen begint de dag vóór het onderzoek.

Voor het onderzoek

Medicijngebruik

Gebruikt uw kind medicijnen, overleg dan ruim van te voren met de arts of dat gebruik tijdelijk gestaakt moet worden.

Vorbereiding

Uw kind wordt de dag voor het onderzoek om 9.00 uur verwacht op de kinderafdeling (route 24). Om de darm goed te kunnen bekijken, is het belangrijk dat deze volledig schoon is. Alle ontlasting moet uit de darm zijn. Daarom krijgt uw kind het laxermiddel Moviprep®. Nadat uw kind met de inname van Moviprep® is begonnen, mag hij/zij niet meer eten. Wel mag hij/zij onbeperkt helder drinken zoals water, thee, limonade of heldere bouillon.

Hieronder volgt het innameschema

- De dag voor het onderzoek begint uw kind met een normaal ontbijt.
- U wordt met uw kind om 9.00 uur op de kinderafdeling verwacht (route 24). Uw kind mag vanaf nu niets meer eten.
- Uw kind neemt tussen 10.00 en 12.00 uur 1 liter Moviprep® en tenminste een halve liter heldere drank.
- Uw kind neemt tussen 18.00 en 20.00 uur 1 liter Moviprep® en tenminste een halve liter heldere drank.
- Als het drinken echt niet lukt, zal het soms noodzakelijk zijn om een sonde in te brengen.
- De pedagogisch medewerkster kan zo nodig op leeftijdsniveau uitleg geven over het inbrengen van de sonde.
- Het is belangrijk om naast de Moviprep® veel extra te drinken, zoals staat aangegeven. Blijft er ontlasting komen? Laat uw kind dan doordrinken totdat er alleen nog helder, lichtgeel vocht uitkomt.

- Voor de smaak kan er wat limonadesiroop aan de Moviprep® toegevoegd worden.
- Probeer uw kind in beweging te laten blijven.

- Blijf in de buurt van het toilet.
- Neem extra ondergoed mee naar het ziekenhuis.

De dag van het onderzoek

- Uw kind krijgt een operatiejasje aan.
- Er worden 'Emla'-pleisters geplakt op de handen van uw kind, om de huid te verdoven zodat het prikken van een infuus minder pijnlijk is.
- Uw kind mag tot twee uur voor het onderzoek helder drinken.

Het onderzoek

Bij de patiëntenontvangst van de operatiekamer krijgt uw kind een infuus waardoor een narcosemiddel toegediend wordt. Door een zacht knijpertje aan de vinger van uw kind worden de hartslag en het zuurstofgehalte gecontroleerd. U mag bij uw kind blijven totdat hij/zij onder narcose is. Tijdens het onderzoek gaat u terug naar de kinderafdeling.

De coloscopie wordt verricht door een maag-darm-lever arts en een endoscopieverpleegkundige. Tijdens de coloscopie kan de arts indien nodig, met een klein tangetje wat weefsel van de binnenkant van de darm wegnemen voor onderzoek. Dit heet een biopsie.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek zelf duurt twintig minuten, vervolgens slaapt uw kind eerst uit op de uitslaapkamer en later op de kinderafdeling. De voorbereiding begint met de dag voor het onderzoek.

Na het onderzoek

- Na het onderzoek wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht, er wordt naar de kinderafdeling gebeld als u naar de uitslaapkamer toe mag. Als uw kind goed wakker is gaat hij naar de kinderafdeling.
- Het kan zijn dat uw kind nog een opgeblazen gevoel heeft. Door winden te laten verdwijnt dit. Uw kind mag na het onderzoek weer gewoon eten en drinken.
- Als er weefsel is weggenomen, kan er wat bloed bij de ontlasting zitten. Als dit een tot twee keer na het onderzoek gebeurt, is dit normaal.

De uitslag

De maag-darm-lever arts vertelt u meestal direct na het onderzoek het voorlopige resultaat. De uitslag van het weefselonderzoek krijgt u ongeveer een week later van uw eigen kinderarts. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt op de kinderopholiekliniek.

Naar huis

Als uw kind voldoende hersteld is, mag hij/zij onder begeleiding naar huis. In verband met de uitwerking van het slaapmiddel mag uw kind niet alleen naar huis of zelf een fiets of bromfiets besturen. Uw kind mag wel weer gewoon eten en drinken.

Complicaties en contact

Complicaties na een coloscopie komen zelden voor. Mocht uw kind toch pijn hebben of zich niet lekker voelen, geef dit dan door aan de verpleegkundige of arts. Als uw kind thuis hevige buikpijn, koorts of bloedverlies krijgt, bel dan met het ziekenhuis.

Heeft u nog vragen, stel deze dan gerust aan de arts of verpleegkundige. Of bel met de Endoscopie-afdeling of de polikliniek Kindergeneeskunde.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl

Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact

polikliniek Kindergeneeskunde, locatie West

T 020 510 88 90 (ma t/m vrij 8.00 – 16.30 uur)

Route 32

afdeling Endoscopie, locatie West

T 020 510 81 76 (ma t/m vrij 8.00 – 16.30 uur)

Route 16

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden

Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, april 2017\2168