

Mesalazine bij colitis ulcerosa

Pentasa®, Salofalk®, Mezavant®, Claversal®, Dipentum®, Asacol®

Uw behandelend maag-darm-leverarts en/of verpleegkundig specialist IBD heeft met u gesproken over het gebruik van mesalazine. In deze folder krijgt u informatie over de werking van dit medicijn en het gebruik van dit medicijn. Ook leest u hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Deze folder is géén vervanging van de bijsluiter die u bij de apotheek krijgt.

Mesalazine (Pentasa®, Salofalk®, Mezavant®, Claversal®, Dipentum®, Asacol®)

Mesalazine wordt voorgeschreven als eerste stap in de behandeling van colitis ulcerosa. Voor de ziekte van Crohn is uit onderzoek gebleken dat de werking onvoldoende is. Hoe mesalazine precies werkt is niet helemaal bekend. Mogelijk remt mesalazine de productie van een hormoonachtige stof, prostaglandine genaamd. Deze stof regelt in u darmwand alles rondom wondjes/ontstekingen. Bij colitis ulcerosa heeft u allemaal kleine wondjes zitten op de darmwand van uw dikke darm. Deze wondjes zijn een gevolg van een darmontsteking. Mesalazine werkt waarschijnlijk als een soort beschermlaagje op uw darmwand, waardoor de wondjes/ontstekingen rustig worden en er geen nieuwe kunnen ontstaan.

Mesalazine is bekend onder de volgende merknamen: Pentasa®, Salofalk®, Mezavant®, Claversal®, Dipentum®, Asacol®. Het verschil tussen deze middelen zit in de beschermlaag (het jasje) dat om het medicijn heen zit. Deze beschermlaag heeft invloed op waar het medicijn moet gaan werken in uw lichaam. Let dus bij het ophalen van dit medicijn dat u het juiste merk krijgt van de apotheek of overleg zo nodig met uw behandelend arts verpleegkundig specialist IBD.

Hoe moet ik mesalazine gebruiken?

Mesalazine is oraal (via de mond) verkrijgbaar als tablet en granulaat (korrels). De meest gebruikte dosering is 4 gram per dag. De tabletten of granulaat sticks kunt u allen in 1 keer innemen liefst tijdens het eten, om zo de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk te maken. Slik de tabletten met water in hun geheel door. Granulaat (korrels) kan je met een lepel met vla, yoghurt, kwark of appelmoes innemen. Drink daarna nog een paar slokken water om alle korrels uit uw mond te verwijderen. Het is belangrijk dat u de korrels niet kapot bijt. Mogelijk ziet u na het gebruik van de granulaat (korrels) variant

wat korrels in uw ontlasting zitten. Dit is normaal en hoeft u zich geen zorgen om te maken.

Daarnaast is mesalazine ook topicaal (lokaal) verkrijgbaar als zetpil en klysma. Bij een opvlamming van de colitis kan het soms nodig zijn om lokale therapie toe te voegen aan de behandeling. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist IBD.

Wat zijn de bijwerkingen van mesalazine?

Mesalazine geeft meestal weinig tot geen bijwerkingen. Heeft u echter last van (mogelijke) bijwerkingen, raadpleeg dan altijd u verpleegkundig(e) (specialist) of behandelend specialist. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- Huiduitslag, jeuk
- Misselijkheid, slechte eetlust
- Buikkrampen
- Haaruitval
- Duizeligheid, hoofdpijn
- Leverontsteking, nierfunctiestoornis (zeldzaam)

Jaarlijks wordt uw nierfunctie gecontroleerd via een bloedonderzoek.

Reizen

Tijdens het gebruik van mesalazine kan u prima op reis.

Tip: Haal voordat u op reis gaat een medicijnpaspoort bij de apotheek. Vraag uw behandelend arts of verpleegkundig specialist IBD om een Engelstalige brief met u ziektegeschiedenis, huidige medicatie en telefoonnummers voor nood.

Vaccinaties (inenting)

In tegenstelling tot veel andere medicatie voor colitis ulcerosa, heeft mesalazine geen nadelig effect op vaccinaties.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Mesalazine is niet van invloed op de vruchtbaarheid van zowel man als vrouw. Mesalazine kan tijdens de zwangerschap veilig worden gebruikt. Overleg wel altijd met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist IBD.

Als u graag zwanger wilt worden. Mesalazine kan ook worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Tot slot

- Heeft u lichamelijke klachten, neem dan contact op met uw verpleegkundig specialist IBD. De verpleegkundig specialist kan zo nodig overleggen met uw behandelend arts.
- Zijn uw problemen of vragen niet dringend, overleg deze dan met uw behandelend arts tijdens uw bezoek aan de polikliniek.
- Wilt u eerder uw behandelend arts spreken, maak dan een afspraakverzoek via MijnOLVG of bel met de polikliniek Maag- Darm en Leverziekten voor een telefonisch overleg.

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota. Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online

- www.olvg.nl/maag-darm-en-leverziekten

Contact

polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten

T 020 510 87 77 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

E mdl@olvg.nl

Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA), locatie Oost

T 020 510 87 77 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

afdeling Endoscopie, locatie West

T 020 510 81 76 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)

Route 16

Na 16.15 uur en in het weekend

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost

T 020 599 30 16

afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West

T 020 510 81 61

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 13 augustus 2021, foldernr.4325