

Dunne darmassage röntgenonderzoek

U heeft in overleg met uw arts besloten een doorlichtingsonderzoek met contrastmiddel uit te laten voeren. Met dit onderzoek is het mogelijk delen van het lichaam zichtbaar te maken op röntgenfoto's, die met foto's zonder contrastmiddel niet te zien zijn. In deze folder geven wij u informatie over het onderzoek.

Belangrijk

- Let goed op de voorbereidingen! Het onderzoek kan alleen doorgaan als u deze voorbereidingen volgt.
- Weet u dat u overgevoelig bent voor bepaalde genees- of contrastmiddelen, dan verzoeken wij u dringend dit vóór het onderzoek te melden aan de behandelend arts of de radiologisch laborant.
- Als u zwanger bent, of denkt te zijn, neem dan vóór het onderzoek contact op met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Tijdens de zwangerschap maken we liever geen röntgenfoto's, tenzij het echt noodzakelijk is.

Het onderzoek: röntgenonderzoek dunne darmassage

Met een röntgenonderzoek van de dunne darm kunnen we eventuele afwijkingen aan de dunne darm opsporen. De dunne darm is niet zichtbaar op röntgenfoto's. Om de darm zichtbaar te maken, is het nodig dat u voor het onderzoek een dieet volgt. Tijdens het onderzoek krijgt u een contrastmiddel, waardoor de darm zichtbaar wordt op de foto's.

Vorbereiding thuis

- Voor dit onderzoek is het nodig dat de dunne darm leeg is. Het is daarom belangrijk dat u het dieet uit deze folder zo nauwkeurig mogelijk opvolgt. Het onderzoek lukt alleen als u het dieet heeft gevolgd.
- U heeft voor het dieet ook het middel X-Praep nodig. Dit ontvangt u bij de balie van de afdeling Radiologie. Het dieet staat achterin deze folder.

Het onderzoek

De radioloog voert het onderzoek uit. Een radiologisch laborant helpt daarbij. Voor het onderzoek moet u zich uitkleden, u kunt uw onderbroek aanhouden. U krijgt een ziekenhuisschort en sloffen aan. U neemt plaats op de onderzoektafel. Om de darmen op de foto zichtbaar te maken krijgt u een contrastmiddel. Dit is Bariumpap. De radioloog brengt het contrastmiddel via een slangetje in uw neus naar de dunne darm.

Voordat de radioloog het slangetje inbrengt, verdooft hij uw neus met een gel. Dit kan even een prikkelend gevoel in de neus veroorzaken. Tijdens het inbrengen van het slangetje wordt u gevraagd te slikken. Als het slangetje op de juiste plaats is, plakt de radioloog het slangetje vast op uw neus. Via het slangetje laat de radioloog het contrastmiddel in uw darmen lopen. Dit is niet pijnlijk. Daarna maakt hij de foto's. Na het maken van de foto's verwijdert hij het slangetje uit uw neus.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer één uur.

Na het onderzoek

De eerste dagen na het onderzoek kan uw ontlasting wit zijn. Dit komt door het witte contrastmiddel. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. Binnen een paar dagen tot een week is uw ontlasting weer normaal van kleur.

De uitslag

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, krijgt binnen vijf dagen de uitslag van het onderzoek.

Dieet bij röntgenonderzoek van de dunne darm

Bij dit dieet horen vier tabletten Bisacodyl van 5 milligram en twee potjes Magnesiumsulfaat van 13,5 milligram.

Belangrijk

- Neem dit dieet één dag vóór het onderzoek.
- Gebruik alleen de voeding die in dit dieet wordt genoemd.
- Van de voeding die u wel mag nemen, mag u zoveel nemen als u wilt.
- Het is belangrijk dat u veel drinkt. Drink daarom meer dan twee liter (meer dan 15 kopjes of glazen) van de in de lijst genoemde dranken.
- Als u een ander dieet volgt, bijvoorbeeld een diabetesdieet, neem dan voor het onderzoek contact op met de arts die het onderzoek heeft voorgeschreven.
- U krijgt meestal diarree door de medicijnen van dit dieet. Dit kan al één uur na het innemen van de medicijnen beginnen. Blijf daarom in de buurt van het toilet.
- Door dit dieet kan de anticonceptiepil niet meer werken.

Medicijnen

Neem uw medicijnen gewoon in met water op de tijden die u gewend bent.

De dag voor het onderzoek

Vóór het ontbijt

- Neem één potje Magnesiumsulfaat van 13,5 milligram. Los dit op in twee glazen lauw of warm water.
- Neem ook twee tabletten Bisacodyl (2 x 5 milligram) met water in.

Ontbijt

U kunt kiezen uit: witbrood, creamcrackers, wit knäckebröd. U mag dit besmeren met margarine. Voor het beleg kunt u kiezen uit:

- gewone kaas of gewone smeerkaas, zonder komijn, kruidnagel, noten en dergelijke
- vleeswaren zonder stukjes noot of groenten
- vis of ei
- honing, stroop, vruchtenhagel, suiker, chocoladestrooisel, chocoladepasta of onge vulde ontbijtkoek

In de loop van de morgen (10.00 uur)

U kunt gebruiken koffie, thee (eventueel met melk en/of suiker), water, limonade of frisdrank, gezeefd vruchtensap, bouillon van bouillonblokjes, melk, karnemelk, chocolademelk of yoghurt (géén vruchtenyoghurt).

Lunch (12.00 uur)

Gebruik een broodmaaltijd als bij het ontbijt.

Let op: U kunt de lunch en de avondmaaltijd omwisselen.

In de loop van de middag (15.00 uur)

U kunt gebruiken: koffie, thee (eventueel met melk en/of suiker), water, limonade of frisdrank, gezeefd vruchtensap, bouillon van bouillonblokjes, melk, karnemelk, chocolademelk of yoghurt (géén vruchtenyoghurt).

Avondmaaltijd (tussen 17.00 en 19.00 uur)

Voor de warme maaltijd kunt u kiezen uit:

- bouillon van bouillonblokjes
- zacht gebakken of gekookt vlees, vis of kip
- nagerecht: vla, pudding, bloempap, griesmeelpap, yoghurt, kwark of ijs, echter zonder krenten, rozijnen, vruchten, noten of grove graanproducten

Let op: u kunt de lunch en de avondmaaltijd omwisselen.

Twee uur na de avondmaaltijd

- Neem weer een potje Magnesiumsulfaat van 13,5 milligram en los dit op in twee glazen lauw of warm water.
- Neem ook weer twee tabletten Bisacodyl (2 x 5 milligram) met water in.

Na het innemen van deze medicijnen MAG U NIET MEER ETEN !

Tot 24.00 uur 's nachts mag u nog wel drinken.

Heeft u het onderzoek de volgende voor 12.00 uur?

Dan mag u niets meer eten en drinken op deze dag.

Heeft u het onderzoek op de volgende dag na 12.00 uur?

Dan mag u op de onderzoeksdag nog wel een licht ontbijt nemen: een beschuit en een kopje thee.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online

- www.olvg.nl/radiologie

Contact

afdeling Radiologie, locatie Oost

T 020 599 33 25 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

E radiologieoosterpark@olvg.nl

Route C1

afdeling Radiologie, locatie West

T 020 510 88 98 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

Route 15

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 2 mei 2018, 3246