

Iontoforese pijnbehandeling

U krijgt binnenkort een iontoforese-behandeling. Dit is een behandeling om de pijn te verminderen. Tijdens de behandeling krijgt u medicijnen via de huid toegediend.

Wat is iontoforese?

Iontoforese is een behandeling waarbij medicijnen door de huid worden toegediend. Deze toediening is alleen mogelijk met behulp van een zwakke elektrische stroom. De behandeling gebeurt met een iontoforese-apparaat en 2 pleisters (zie afbeelding).

U bespreekt met de arts welke medicatie en hoeveel behandelingen u krijgt.

Voor wie?

Bij welke patiënten kan iontoforese gebruikt worden:

- Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS)
- Aandoeningen bewegingsapparaat
- Neuropatische pijn
- Pijn na een operatie

Vorbereiding iontoforese

Medicijnen

Deze kunt u innemen zoals u gewend bent.

Eten drinken

U mag voor de behandeling alles eten en drinken

Kleding en sieraden

Draag makkelijk zittende kleding. Wij verzoeken u geen sieraden te dragen in het te behandelen gebied.



Gebruik op de dag van de behandeling geen bodylotion

Lees onderstaande vragen

Beantwoordt u één of meer vragen met ja? Vertel dit dan aan de pijnarts:

- Bent u (mogelijk) zwanger?
- Bent u overgevoelig voor verdovingsmiddelen zoals lidocaïne, esketamine (Ketanest-s)
- Bent u overgevoelig voor hormoonpreparaten zoals dexamethason?
- Bent u overgevoelig voor clonidine (Catapresan®)
- Heeft u hartklachten door hoge bloeddruk of hartritmestoornissen?
- Heeft u een pacemaker?
- Heeft u een neurostimulator, blaasstimulator of ruggenmergstimulator?
- Heeft u een bijniertumor?
- Heeft u wondjes in het pijnlijke gebied?

Waar meldt u zich?

U meldt zich op het afgesproken tijdstip in OLVG, locatie West.

- Op maandag is de behandeling op de OK- behandelkamer, route 22A.
- Op vrijdag is de behandeling op de polikliniek Anesthesiologie en pijnbestrijding, route 5.

De dag van de behandeling

Een doktersassistent of verpleegkundige voert de behandeling uit.

- U krijgt twee pleisters op uw huid geplakt, een pleister is voor elektrische geleiding en de andere pleister voor de toediening van de medicatie
- Beide pleisters zijn met een snoetje verbonden aan het iontoforese-apparaat.
- Als het apparaat is ingesteld, start de behandeling en wordt er zwakke stroom door de medicijnpleister gevoerd. Hierdoor worden de medicijnen vanuit de pleister door de huid in uw lichaam opgenomen.
- Tijdens de behandeling kan uw huid onder de pleister wat gaan prikken.
- De behandeling duurt 15 tot 30 minuten.

Na de behandeling

De huid kan branderig aanvoelen en de huid kan een beetje rood zijn. Dit trekt vanzelf weg. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol (3 tot 4 keer per dag 1000 milligram).

Mogelijke complicaties en bijwerkingen

Na de iontoforese-behandeling heeft u soms last van bijwerkingen. Deze klachten gaan vanzelf over:

- Huiduitslag
- Prikkend of brandend gevoel
- Brandwondjes of blaarvorming
- Duizelig
- Misselijk.
- Heeft u diabetes? Dan kunnen de glucosewaarden hoger zijn. Controleer deze daarom wat vaker.

Vragen?

Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota. Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

Meer informatie online

- www.olvg.nl/pijncentrum

Contact

Polikliniek Pijnbestrijding, locatie West

T 020 510 81 63 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

E polipijnbestrijding@olvg.nl

Route 05

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl | Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 23 februari 2021, foldernr.3648