

# Behandeling MS - Ofatumumab (Kesimpta®)

Ofatumumab (Kesimpta®) zorgt ervoor dat het immuunsysteem wordt aangepast door een bepaald type witte bloedcellen uit het lichaam te onderdrukken (de zogenaamde B- cellen). Hierdoor komen er minder ontstekingscellen bij de hersenen en het ruggenmerg.

Het is een injectie die je eenvoudig zelf kan toedienen met een speciale pen. Deze injectie kunt u zelf thuis toedienen. Er is geen ziekenhuisopname nodig.

## Dosering

Ofatumumab is een subcutane injectie welke je zelf onder de huid injecteert. De eerste gift wordt op de dagbehandeling gegeven of wordt via een speciaal getrainde zorgprofessional thuis gegeven.

De dosering wordt opgebouwd, de eerste weken injecteer je wekelijks. Dan sla je een week over en vanaf dan kan er maandelijks geïnjecteerd worden. (dus week 0, 1 en 2 gevolgd door maandelijks injecties vanaf week 4)

## Belangrijkste bijwerkingen

- Bovenste luchtweginfecties
- Systemische injectie gerelateerde reacties: na injectie kortdurende symptomen zoals verstopte neus, duizelig, druk op de borst, hartkloppingen.
- Reacties op de injectieplaats
- Urineweginfecties

## Wat kunt u verwachten en wat verwachten wij van u?

Bij het starten van deze medicatie is het belangrijk dat u uw bloed volgens de aangegeven frequentie in OLVG laat controleren. Wij zullen u hierin ondersteunen maar wij vragen ook of u hier ook zelf verantwoordelijkheid en overzicht in kunt houden. Zodat we de zorg samen goed laten verlopen.

Als u de mijnOLVG MyChart app gebruikt vindt u informatie over het ziektebeeld en verschillende medicatiemogelijkheden.

Ook ziet u het overzicht van de afspraken, en wanneer er bijvoorbeeld een bloedcontrole moet worden gedaan.

## Hieronder vindt u een overzicht van de afspraken

---

### Ofatumumab

Wanneer	Actie
Na 1 maand	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telefonische afspraak bij de verpleegkundig specialist of physician assistant (VSPA)</li></ul>
Na 6 maanden (voor derde gift)	<ul style="list-style-type: none"><li>• MRI-hersenen zonder contrast (baseline)</li><li>• Hierna afspraak bij neuroloog voor uitslag en controle</li></ul>
Elke 6 maanden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bloedcontrole(lab) in OLVG</li></ul>
Elk jaar	<ul style="list-style-type: none"><li>• MRI-hersenen zonder contrast</li><li>• Hierna afspraak bij neuroloog voor de uitslag.</li></ul>
Elk jaar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleafspraak bij de VSPA</li></ul>

Wanneer u van een ander medicijn switcht naar ofatumumab kan het zijn dat er meerdere MRI's gemaakt worden.

De laboratoriumformulieren kunt u ophalen bij de balie van de poli Neurologie **of zijn in de app te vinden**. Desgewenst kunnen we dit formulier naar uw huisadres opsturen. Wanneer u geen bericht krijgt over de uitslag van het bloed is dit een goed bericht. Wanneer er iets afwijkends wordt gevonden in het bloed nemen wij contact met u op.

### Hoe en wanneer u contact met ons op kan nemen

- Bij vragen over eventuele MS gerelateerde klachten (nieuwe of toename van klachten) of bijwerkingen van de medicatie kunt u een vraag stellen via MijnOLVG, dit heeft de voorkeur vanwege uw privacy. **Wij zullen dan binnen 5 werkdagen reageren**
- Graag attenderen wij u er op dat in de mijnOLVG omgeving, veel gestelde vragen staan waar u misschien al antwoord op uw vraag kunt vinden.
- Voor het maken van een telefonische of live afspraak kunt u contact opnemen met de polikliniek neurologie OLVG Oost 020-5993045 of OLVG West 020-5108883.
- Bij spoed, of klachten die waarschijnlijk niets met MS te maken hebben, vragen wij u contact op te nemen met de huisarts.

### Zwangerschap en borstvoeding

Wij adviseren patiënten niet te zwanger te worden zolang ze deze medicatie gebruiken, tot 6 maanden na de laatste injectie.

Borstvoeding geven wordt afgeraden.

### Vaccinaties

Vaccinaties met een levend verzwakt vaccin moeten minimaal 4 weken voor start van de behandeling gebeuren omdat ofatumumab de vorming van antistoffen kan beïnvloeden. Bij een inactief (dood) vaccin is dit 2 weken. De ofatumumab kan de effectiviteit van de vaccins beïnvloeden. Bespreek bij twijfel dit altijd met uw neuroloog of verpleegkundig specialist of physician assistant.

## Veelgestelde vragen

### Wat te doen bij ziekte, zoals griep/koorts?

Wanneer u ziek bent en het langer duurt dan gebruikelijk of er sprake is van koorts boven de 38 graden is het verstandig om contact met uw huisarts op te nemen.

### Mag ik alcohol gebruiken in combinatie met ponesimod?

Ja, dat mag, tenzij de leverwaarden stijgen.

### Wat is het effect op orale anticonceptie (“de pil”)?

Ponesimod heeft geen effect op de werking van orale anticonceptie.

## Vragen?

### Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op [www.olvg.nl/vergoeding-kosten-behandeling](http://www.olvg.nl/vergoeding-kosten-behandeling)

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op [www.olvg.nl](http://www.olvg.nl) maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

### Meer informatie online

- [www.olvg.nl/neurologie](http://www.olvg.nl/neurologie)
- [www.neurologie.nl](http://www.neurologie.nl)

## Contact

### polikliniek Neurologie, locatie Oost

T 020 020- 510 88 83 (werkdagen 8.15 – 16.30 uur)  
P3

### polikliniek Neurologie, locatie West

T 020 510 88 83 (werkdagen 8.15 – 16.30 uur)  
route 12

Oost  
Oosterpark 9  
1091 AC Amsterdam

West  
Jan Tooropstraat 164  
1061 AE Amsterdam

Spuistraat  
Spuistraat 239 A  
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: [www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden](http://www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden)

Aanmelden MijnOLVG via [www.mijnolvg.nl](http://www.mijnolvg.nl) | Klacht of opmerking: [www.olvg.nl/klacht](http://www.olvg.nl/klacht)

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 4 oktober 2022, foldernr.4410